

G การ์ลิก-โต GARLIC-TO

กระเทียมสกัดสูตรเข้มข้นผลิตจากแหล่งวัตถุดิบทางภาคเหนือของไทย นำมาคัดแยกเปลือก แล้วผ่านขบวนการ spray dried จนให้ผงแห้งละเอียดคงไว้ซึ่งคุณประโยชน์และสรรพคุณทางสมุนไพร

Concentrate Garlic Extract made from raw material sources in northern part of Thailand which is peeled and spray dried into powder. Garlic-To maintains all of the benefits and properties of herbs.

การ์ลิก-โต ประกอบด้วยสารอัลลิซิน (allicin) และอนุพันธ์ของอัลลิซิน เช่น ไดอัลลิลซัลไฟด์ (diallyl sulfide) และไดอัลลิลไดซัลไฟด์ (diallyl disulfide) ซึ่งเป็นสารประกอบกำมะถันที่มีฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรียที่มีทำให้เกิดโรคได้ โดยไม่รบกวนแบคทีเรียตัวอื่นที่มีประโยชน์ต่อลำไส้ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา ไวรัสและโปรโตซัว รวมทั้งมีฤทธิ์กระตุ้นการขับถ่ายและช่วยกำจัดเชื้อโรคอีกด้วย

การ์ลิก-โต ช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน จึงสามารถช่วยบรรเทาอาการอักเสบเนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา

การ์ลิก-โต ประกอบด้วยใยอาหารชนิดละลายน้ำได้ โดยเฉพาะอินนูลิน และฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ช่วยส่งเสริมการเจริญของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้

การ์ลิก-โต ประกอบด้วยซีเลเนียม (Selenium) ซึ่งเป็นแอนติออกซิแดนท์ (Anti-oxidant) ช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อเยื่อถูกทำลาย

ส่วนประกอบใน 1 กิโลกรัม

- สารเหนียว 10%
- กระเทียมผง 90%

อัตราการใช้

1. กรณีแก้ไขอาการขี้ขาว (white gut) ใช้การ์ลิก-โต 3-5 กรัม/อาหาร 1 กก. 2-3 นื้อ/วัน ติดต่อกัน 3-5 วัน
2. กรณีป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย/เชื้อราที่ก่อให้เกิดโทษ ใช้การ์ลิก-โต 1-3 กรัม/อาหาร 1 กก. วันละ 1 นื้อ

การผสม นำการ์ลิก-โต ตามปริมาณที่ต้องการใช้มาผสมอาหารให้ทั่ว จากนั้นพรมน้ำพอหมาด ๆ พึ่งให้แห้ง

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

จัดทำจำหน่ายโดย

Garlic-To contains sulfur compounds allicin and derivatives of allicin: diallyl sulfide and diallyl disulfide. These compounds can kill bacteria that usually cause the disease without disturbing the other bacteria that are beneficial to the intestines. Moreover, it also inhibited growth of fungi, viruses and protozoa as well. Garlic-To is used as a laxative and bactericidal in pathology well.

Benefits

- Stimulate immune system which help to relieve inflammation from bacteria or fungi infection
- Promote growth of useful microorganism in intestine by water soluble fiber especially inulin and Fructooligosaccharide in Garlic-To
- Prevent tissue damage with Selenium mineral

Composition (1 Kg)

- Garlic powder 90 %
- Binder 10 %

Recommended Dosage:

1. Treatment program (white gut) : 3-5 g/kg feed, 2-3 times/day for 3-5 days
2. Prevention program : 1-3 g/kg feed, 1 time a day

Application

1. Applied as top dressing on feed
2. Mix well then put little water
3. Let it air dry before use

Registration No :

Lot No.



บริษัท มารีน ลีดเดอร์ จำกัด
18/19 ซ.จันทน์ 43 แขวง 26-5 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2212-4672, 081-565-6659 โทรสาร. 0-2212-4673
E-mail : marineleader@hotmail.com www.marineleader.co.th

MARINE LEADER CO., LTD.
18/19 Soi Chan 43 Yaek 26-5 Bangkhlo, Bangkokholaem,
Bangkok 10120 Thailand
Tel : +66 2212 4672 , Fax : +66 2212 4573
E-mail : marineleader@hotmail.com www.marineleader.co.th

GARLIC-TO

การ์ลิค-โต



กระเทียมสกัดสูตรเข้มข้นผลิตจากแหล่งวัตถุดิบทางภาคเหนือของไทยนำมา คัดแยกเปลือกแล้วผ่านกระบวนการ spray dried จนให้ผงแห้งละเอียด คงไว้ ซึ่งคุณประโยชน์และสรรพคุณทางสมุนไพร

การ์ลิค-โต ประกอบด้วยสารอัลลิซิน (alliin) และอนุพันธ์ของอัลลิซิน เช่น ไดอัลลิลซัลไฟด์ (diallyl sulfide) และไดอัลลิลไดซัลไฟด์ (diallyl disulfide) ซึ่งเป็นสารประกอบกำมะถันที่มีฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรียที่มัก ทำให้เกิดโรคได้ โดยไม่รบกวนแบคทีเรียตัวอื่นที่มีประโยชน์ต่อลำไส้ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา ไวรัส และโปรโตซัวอีกด้วย จึงใช้เป็นยาถ่ายหรือยาฆ่าพยาธิได้ดี

การ์ลิค-โต ช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันจึงสามารถช่วยบรรเทาอาการอักเสบเนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา

การ์ลิค-โต ประกอบด้วยใยอาหารชนิดละลายน้ำได้ โดยเฉพาะอินนูลินและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ ช่วยส่งเสริมการเจริญของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้

การ์ลิค-โต ประกอบด้วยซีเลเนียม (Selenium) ซึ่งเป็นแอนติออกซิแดนท์ (Anti-oxidant) ช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อเยื่อถูกทำลาย

อัตราการใช้

1. กรณีแก้ไขอาการซีสขาว (white gut) ใช้การ์ลิค-โต 3- 5 กรัม / อาหาร 1 กก. 2-3 มื้อ/วัน ติดต่อกัน 3-5 วัน
2. กรณีป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย/เชื้อราที่ก่อให้เกิดโทษ ใช้การ์ลิค-โต 1-3 กรัม / อาหาร 1 กก. วันละ 1 มื้อ

การผสม

นำการ์ลิค-โต ตามปริมาณที่ต้องการใช้มาผสมอาหารให้ทั่ว จากนั้นพรมน้ำพอหมาด ๆ ผึ่งให้แห้ง

จัดจำหน่ายโดย



18/19 ซ.จันทน์43 แยก26-5 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-2124672 แฟกซ์. 02-2124673 อีเมลล์ marineleader@hotmail.com เว็บไซต์ www.marineleader.co.th