



Red Oil

Haematococcus

สารต้านอนุมูลอิสระชั้นเลิศเพื่อสุขภาพและสีที่ดี

แอสตาแซนธินจากธรรมชาติในน้ำมัน สามารถดูดซึมผ่าน
ลำไส้ของสัตว์ได้ดียิ่งขึ้น



ไมโครอิมัลชัน

เรด ออย ถูกผลิตให้อยู่ใน
รูปของ ไมโครอิมัลชัน
แอสตาแซนธิน ทำให้มีการ
กระจายตัวได้ดี ตรงเข้าสู่
อวัยวะเป้าหมายได้เร็ว ทำ
ให้มีการดูดซึมและออกฤทธิ์
ได้ดีมากยิ่งขึ้น



พ่อแม่พันธุ์ และ สัตว์น้ำวัยอ่อน

- เพิ่มสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์
- เพิ่มอัตราการฟักและอัตราการรอดของลูกพันธุ์
- ลดอัตราความพิการของลูกพันธุ์
- เพิ่มพัฒนาการที่ดีของลูกพันธุ์
- เพิ่มปริมาณการสะสมแคโรทีนอยด์ในไข่แดง
- เพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกัน

คลุก เรด ออย กับ ปลาหมึกหั่นชิ้น อัตราส่วน 20 ซีซี/ปลาหมึก 1 กก.

คลุก เรด ออย กับอาหารเม็ด 20-30 ซีซี สำหรับคลุกอาหาร 1 กก.

ปลาสวยงาม

- เพิ่มสีสันให้กระจ่างใส มันวาว แลดูสุขภาพดี
- ช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่สัตว์น้ำ

ผสม เรด ออย 20 – 30 ซีซี /อาหาร 1 กก.



ส่วนผสมหลัก	สำหรับ <i>Haematococcus pulvialis</i> และ น้ำมันจากสัตว์ทะเล	
ส่วนประกอบ	ไขมัน	70 – 80 %
	แอสตาแซนธิน	0.42 %
	กลุ่มของแคโรทีนอยด์	0.07 %
ลิวทีน, แคนตาแซนทีน, ซีแซนทีน, เบต้าแคโรทีน		




ปริมาณ 1 ลิตร




MARINE LEADER CO., LTD.

18/19 Soi Chan 43 Yaek 26-5 Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok 10120

Tel: +66 2212 4672 Fax: +66 2212 4573 E-mail: marinereader@hotmail.com www.marineleader.com



คุณสมบัติ	อิลมัลชัน	นาโนอิลมัลชัน	ไมโครอิลมัลชัน
ลักษณะภายนอก	น้ำมีสีขุ่น	น้ำมีสีใส	น้ำมีสีใส
ขนาดของอนุภาค	0.1 – 100 ไมโครเมตร	50 – 1000 นาโนเมตร	10 – 100 นาโนเมตร
ความหนืด	ความหนืดสูง	ความหนืดต่ำ	ความหนืดต่ำ
ความเสถียร	ไม่เสถียร	ไม่เสถียร	เสถียร และมีอายุการเก็บรักษานาน



ผลการทดลอง การสะสมของแอสตาแซนทินในเนื้อเยื่อและ เซลล์ของปลาทู หลังได้รับอาหารผสม *Haematococcus* sp. 8 สัปดาห์

สำหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้ง

1. หั่นปลาหมึกเป็นชิ้นพอเหมาะ
2. นำปลาหมึกที่หั่นไปผัดในเตาร้อน
3. คลุก เรด ออย 20 ซีซี / ปลาหมึก 1 กก.
4. ผสมด้วยวิตามิน วิต้า - วิต 3 กรัม
5. ผสมด้วยแรธาตุ มาริน เม็กซ์ 3 กรัม
6. ผสมด้วย ดีเอชเอ 3 กรัม
7. แช่หมึกที่ผสมแล้วในตู้เย็น เพื่อให้ส่วนผสมต่างๆ ติดและซึมเข้าสู่เนื้อปลาหมึก

สำหรับผสมอาหารสัตว์

1. คลุก เรด ออย 20 ซีซี / อาหาร 1 กก.
2. ผสมด้วยวิตามิน วิต้า - วิต 3 กรัม
3. ผสมด้วยแรธาตุ มาริน เม็กซ์ 3 กรัม
4. ผสมด้วย ดีเอชเอ 3 กรัม

